

SPOC – Suicidal Patient Observation Chart

Patient:

Datum:

Name Überwacher

	Start	Stop
--	-------	------

Trage ein X in das Feld ein, dass dem entspricht, was der Patient ausdrückt oder was beobachtet wird

	Traurig, niedergeschlagen, deprimiert
	Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung
	Hoffnungsvoll, plant für die Zukunft
	Ungern, ängstlich
	Schuldgefühle, schamhaft
	Wütend, irritiert
	Aggressiv, feindlich
	Ruhig
	Zurückgezogen, gedanklich, abwesend, isoliert
	Psychischer Schmerz / Leidensdruck
	Misstrauisch
	Verzerrte Realitätswahrnehmung, psychotisch
	Verwirrt
	Befehlende, imperitative Stimmen
	Sowohl gehobene als auch gedrückte Stimmung
	Plötzliche Veränd. d. Stimmungslage(Affektibilität)
	Impulsivität, impulsive Handlungen
	Motorische Unruhe
	Körperliche Beschwerden /Schmerzen
	Todes-, Suizidwunsch oder -gedanken
	Suizidpläne oder →vorbereitung
	Selbstverletzendes Verhalten, Suizidversuch
	Erliegt prakt. u./o. pers. Angelegenheiten
	Konflikt mit Mitarbeitern, Personal, and.
	Aktivitäten (außerhalb des Zimmers)
	Isst und / oder trinkt
	Kümmert sich um pers. Hygiene
	Schläft